



RESULTADOS EN SALUD DE PEMBROLIZUMAB COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

Del Río Ortega, Paula; Ramis Barceló, Marina Bárbara; Franco González, Rosa María; Gómez Gómez, David; Rioja Carrera, María; Valero Domínguez, Marta;
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
paula.delrio@scsalud.es

Objetivo

Efectividad de **pembrolizumab** como tratamiento de **1ª línea en CPNM**
vs
Eficacia procedente de los **ensayos pivotaes**.

Material y método

Variables <ul style="list-style-type: none">• edad• sexo• histología• %PDL-1• respuesta al tratamiento• fecha de inicio• progresión• éxitus	Subgrupos <ul style="list-style-type: none">• ECOG 0, 1, 2/3• paciente no fumador• exfumador >15 cigarrillos/día• exfumador <15 cigarrillos/día• fumador activo	Análisis de eficacia <ul style="list-style-type: none">• SLP• SG• TRO 4 categorías: RC, RP, EE, PE
---	--	--

Resultados

- ✓ 36,7% mujeres
- ✓ histología predominante □ adenocarcinoma (74,4%)
- ✓ fumadores en momento de diagnóstico □ 35,6%
- ✓ exfumadores (cigarrillos/día) □ <15 (3,3%), >15 (51,7%)
- ✓ no fumadores □ 10%
- ✓ PDL-1 >90% □ 47,8%

90 pacientes

TRO
En 62,2%
pacientes

RP
50%

- Mediana SLP □ 6,21 meses
IC 95% (2,49-9,94)
- Mediana SG □ 23,65 meses
IC 95% (11,53-35,76)

Conclusión

- Pembrolizumab con TRO superior (62.2% vs 58,3%) y medianas de SG y SLP ligeramente inferiores vs KEYNOTE-024.
- Los resultados significativos entre subgrupos probablemente no sean representativos debido a la escasa N.
- Limitación del estudio □ número de pacientes tratados □ recomendable continuar monitorizando resultados.